

مراقبت های بعد از تزریق فیلر:

نسخه پزشک بلافاصله بعد از تزریق استفاده شود.

قرص آناهیل را روزی 3 عدد برای کاهش ورم و کبودی اسفاده کنید.

از آب کرفس و آب آناناس برای کاهش ورم و کبودی استفاده کنید.

به مدت 24 ساعت آب ننزید.

به مدت 24 ساعت آرایش نکنید.

به مدت 72 ساعت باشگاه نروید.

به مدت 72 ساعت به دندانپزشکی مراجعه نکنید.

روی صورت نخوابید.

سیب،ساندویچ، لقمه های بزرگ تا یک هفته گاز ننزید.

در معرض حرارت قرارگرفتن باعث زودتر از بین رفتن فیلر میشود.

به مدت 72 ساعت از مصرف سیگار، قلیان و مشروب خودداری کنید.

خوردن نوشیدنی های خیلی سرد و خیلی گرم تا یک هفته توصیه نمیشود.

پماد جنتامایسین را روزی 2 الی 3 بار در محل تزریق بزنید.

در صورت بروز هرگونه عارضه غیرطبیعی ، حساسیت حتما با کلینیک تماس بگیرید.

ورم و کبودی تا یک هفته بعد از تزریق طبیعی است.

فیلر تزریق شده برای بار اول معمولا حدود 30٪ ماندگاری دارد.

لازم به ذکر است ماندگاری فیلرها با توجه به ناحیه تزریق شده و همچنین

تعداد دفعات تزریق و از همه مهم تر نوع برند متفاوت است.